

ЗАХИСТ ВІД МАРСОНІОЗУ, перевірений часом



syngenta®

СКОР® — системний фунгіцид з лікувальними властивостями та профілактичною активністю для контролю марсоніозу (бурої плямистості) на волоському горіху.

Паспорт препарату:

 ПОВНА НАЗВА	Скор 250 ЕС, к. е.
 ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	250 г/л дифеноконазолу
 ХІМІЧНА ГРУПА	Триазоли
 ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат емульсії
 КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	III
 УПАКОВКА	1 л

Головні переваги препарату:

- Найкращий системний препарат для захисту горіха від марсоніозу (бурої плямистості) з лікувальним ефектом
- Висока профілактична, лікувальна і викорінююча активність
- «Стоп»-ефект завдяки системній дії
- Швидке проникнення у тканини рослини (протягом 2 год), не змивається дощем після обробки
- Незамінний препарат у системі захисту горіха

Застосування препарату:

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування, дні
Волоський горіх	Марсоніоз (бура плямистість)	У період вегетації	0,3–0,5	2/30

Сумісність: Препарат можна змішувати з іншими загальноновживаними пестицидами на відповідній культурі, але в кожному конкретному випадку необхідно перевіряти препарати на сумісність.

+12 °C

ОПТИМАЛЬНА
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ

+24 °C

600 л/га

РЕКОМЕНДОВАНА
НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ

1000 л/га

Особливості застосування продукту

Скор® у своєму складі має діючу речовину для контролю патогенів, які спричиняють утворення різних видів плямистостей, у тому числі марсоніоз (бура плямистість) на горіху. Дифеноконазол відноситься до триазолів, які інгібують один фермент — С14-деметилазу, що виконує ключову роль у біосинтезі стеролів. Стероли, своєю чергою, є структурними компонентами і забезпечують правильний розвиток і функціонування стінок клітин та мембран грибних клітин. Дифеноконазол інгібує біосинтез ергостеролу в клітинах гриба, що призводить до руйнації клітинних стінок і мембран патогену, водночас запобігаючи росту й розвитку грибів.

Марсоніоз (бура плямистість) на листі





Марсоніоз (бура плямистість) на горіху



Особливості застосування Скор® на горіху

1. Скор® — системний фунгіцид з лікувальними властивостями, тому його краще використовувати при перших ознаках або до початку розвитку хвороби.
2. Для отримання лікувальної дії Скор® слід застосовувати двічі з інтервалом 12–14 днів, після чого наступну обробку потрібно провести препаратами з іншого класу діючих речовин.
3. Для успішного контролю марсоніозу (бурої плямистості) обробки необхідно проводити згідно з системою захисту з обов'язковим використанням Скор® і починати з ранньовесняного періоду.
4. Скор® контролює не тільки марсоніоз, а й білу плямистість та фаллостикоз.

Скор® у системі захисту горіха





03680, м. Київ,
вул. Козацька, 120/4, 3-й поверх

тел.: +380 (44) 494 17 71
факс: +380 (44) 494 17 70

Консультаційний центр
тел.: 0 800 50 04 49
Безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні

www.syngenta.ua



Розкриймо потенціал рослини разом