



БІОСТИМУЛЯТОР
ВАШОГО ВРОЖАЮ

Ізабіон®

ЗАХИЩАТИ РОСЛИНИ СТАЄ ПРОСТІШЕ

Більше інформації про даний препарат дізнавайтеся на сайті



ЦІЛЬОВИЙ ОБ'ЄКТ

Томати, огірки, картопля, квітучі рослини

625 г/л пептидів і амінокислот, у тому числі 100 г/л вільних амінокислот

Набір амінокислот, макро- і мікроелементів

Готовий до використання спрей



IV



1 л



5 років

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ СПРЕЮ:

- Короткий шлях від проблеми до рішення
- Простий і зручний у застосуванні
- Економія часу й зусиль
- Не потребує спеціальних знань та обладнання
- Унеможлиблює помилку при приготуванні робочого розчину
- Мінімум контакту з препаратом

КІЛЬКІСТЬ ОБРОБОК. 2–3 за сезон

Культура*	Норма витрати препарату	Фаза внесення
ТОМАТИ	1 л готового препарату на 20 м ²	Позакореневе підживлення (перше — через 5 днів після висадки розсади, друге — формування плодів)
ОГІРКИ		Позакореневе підживлення (перше — висота рослин 10–15 см, друге — через 15–20 днів)
КАРТОПЛЯ		Позакореневе підживлення (перше — висота рослин 10–15 см, друге — через 15 днів, третє — початок інтенсивного формування бульб)
КВІТУЮЧІ РОСЛИНИ (ТРОЯНДИ, ГВОЗДИКИ)		Позакореневе підживлення (перше — початок росту пагонів, друге — через 14 днів)

* Дозволений до використання на всіх культурах згідно з реєстрацією органічного добрива Ізабіон®.