

РЕЗУЛЬТАТИ ВИРОБНИЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Сільськогосподарська культура	Норма використання (л/га)	Кількість обприскувань	Збільшення врожайності (%)	Якісні показники використання препарату
	2	4	35	Зав'язування плодів: + 31 %
	1	3	11	Цукристість: + 27 %
	1	3	24	Активність росту і об'єм грони: + 10 %



syngenta

syngenta.

03022, м. Київ,
вул. Козацька, 120/4, 3-й поверх

тел.: +380 (44) 494 17 71
факс: +380 (44) 494 17 70

Консультаційний центр
тел.: 0 800 50 04 49
Безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні

www.syngenta.ua



НОВИНКА

БІОСТИМУЛЯТОР ВАШОГО ВРОЖАЮ



syngenta.

Розкриємо потенціал рослини разом

Ізабiон® — це сучасне біологічне добриво тваринного походження. Ізабiон складається з повного спектра необхідних для швидкого росту й розвитку рослини амінокислот і пептидів, на синтез яких вона не витрачає додаткової енергії.

У результаті застосування препарату збільшується продуктивність і покращується якість урожаю, значно підвищується стійкість рослин до несприятливих умов навколишнього середовища.



ЗАСТОСУВАННЯ

Упаковка 20 мл розрахована на приготування 4–5 л робочого розчину. За сезон проводять 2–3 обробки.



ВИКОРИСТАННЯ

Культура	Фаза внесення	Норма витрати препарату і робочого розчину
Троянди відкритого ґрунту	Позакореневе підживлення (перше — початок росту пагонів, друге — через 14 днів)	20 мл на 4 л води на 1 сотку
Гвоздика відкритого ґрунту	Позакореневе підживлення (перше — початок росту пагонів, друге — через 14 днів)	20 мл на 4 л води на 1 сотку
Томати відкритого ґрунту	Позакореневе підживлення (перше — через 5 днів після висадки розсади, друге — формування плодів)	20 мл на 5 л води на 1 сотку
Огірки відкритого ґрунту	Позакореневе підживлення (висота рослин — 10–15 см, друге — через 15–20 днів)	20 мл на 4 л води на 1 сотку
Картопля	Позакореневе підживлення (висота рослин — 10–15 см, друге — через 15 днів, третє — початок інтенсивного формування бульб)	20 мл на 5 л води на 1 сотку

У таблиці наведено реєстраційні норми препарату для роздрібного продажу населенню.

У промисловому секторі Ізабiон® застосовують на *плодових культурах* перед цвітінням, на початку утворення плодів, у фазу плід — «волоський горіх»; на *винограді* — перед цвітінням, на початку утворення ягід і при зміні ними кольору; на *капусті* — після укорінення розсади, на початку формування головок; на *цибулі* — на початку утворення цибулин, при зміні кольору покривних лусок під час дозрівання; на *буряку і моркві* — у фазу 3–5 листків, на початку інтенсивного росту коренеплодів, а також на інших культурах.

УНИКАТИ ВИКОРИСТАННЯ З ФУНГІЦИДАМИ, ЩО МІСТЯТЬ МІДЬ.

ПРИЗНАЧЕННЯ

- Збільшення врожаю**
 - Особливо за несприятливих погодніх умов
- Зав'язування плодів**
 - Підвищує фертильність пилку і зменшує обпадання плодів
 - Стимулює утворення квіткових та листових бруньок
- Дозрівання**
 - Пришвидшує дозрівання і збільшує врожайність
 - Однорідність плодів і покращення якості (колір, цукор)
- Антистрес**
 - Природні стреси: низькі та високі температури (похолодання, спека, посуха, заморозки, град та ін.)
 - Жвороби: вірусні, нематоди
 - Фітотоксичність, викликана використанням засобів захисту рослин
- Підсилення дії засобів захисту рослин**
 - Сприяє кращому проникненню у клітини рослини добрив та системних пестицидів, особливо фунгіцидів (використання у бакових сумішах)
- Хлорози**
 - Попередження і відновлення при хлорозах та у бакових сумішах з мікроелементами



Ізабiон®

syngenta.