

Сумісність

Препарат можна змішувати з іншими загально-вживаними пестицидами на відповідній культурі. Сумісний із більшістю фунгіцидів та інсектицидів. У кожному конкретному випадку слід проводити тести на сумісність.

У світі Міравіс® у саду використовують без додаткових партнерів у препаративній формі. Це робить препарат гнучкішим у захисті саду, адже тоді його можна змішувати з контактними або системними фунгіцидами, як-от Скор®. Це забезпечує кращу лікувальну дію суміші в період зараження, яке вже відбулося.

+12 °C

+24 °C

ОПТИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ

Особливості застосування продукту

- Для потрібного ефекту фунгіцид рекомендується застосовувати профілактично або при перших ознаках розвитку хвороби. Профілактичне внесення забезпечує тотальний контроль захворювань рослини в критичний період.
- Потрапляючи на рослину, діюча речовина рівномірно розподіляється і пересувається у тканинах листка та частково зв'язується з восковим шаром і не змивається опадами. Рослина майже повністю поглинає діючу речовину препарату Міравіс® протягом 1 години.
- Тривалість захисного періоду залежить від ступеня інфікованості рослин на момент обробки, фази вегетації рослини і може становити 10–14 днів.
- Рекомендується чергувати Міравіс® із фунгіцидами інших хімічних груп (Скор®, Хорус®) або з контактними фунгіцидами.

syngenta.

03022, м. Київ,
вул. Козацька, 120/4, 3-й поверх

тел.: +380 (44) 494 17 71
факс: +380 (44) 494 17 70

Консультаційний центр
тел.: 0 800 50 04 49
Безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні

www.syngenta.ua



НОВИНКА

Вища Ліга садівництва



Miravic®

syngenta.

Розкриймо потенціал рослини разом

Miravic®

syngenta.

Міравіс® — унікальний широкий спектр контролю захворювань на плодових культурах

Новий унікальний механізм дії. Найефективніший фунгіцид у новому класі революційної групи продуктів.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

 ПОВНА НАЗВА	Miravic® 200 SC, к. с.
 ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	200 г/л Адепідину™
 ХІМІЧНА ГРУПА	Карбоксаміди (SDHI)
 ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат суспензії
 КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	II
 УПАКОВКА	3 мл, 45 мл



Головні переваги препарату

- Тривалий захист від ключових хвороб
- Трансламінарний ефект із локально-системною дією, що забезпечує пролонгований захист
- Неперевершена стійкість до змивання опадами
- Ефективний у складних погодних умовах — при температурі до +35 °C та вологості понад 80 %
- Не викликає фітотоксичності
- Основа антирезистентної стратегії — унікальний партнер для бакових сумішей

Застосування препарату

Культура	Норма витрати препарату	Норма витрати робочої рідини	Шкідливі об'єкти	Кратність обробок / Термін очікування
ЯБЛУНЯ	3 мл на 8–10 л води	2–5 л розчину на дерево залежно від розміру крони	Парша, борошниста роса, моніліоз плодів	2/40

Спектр дії препарату Miravic® у саду

ЯБЛУНЯ



ПАРША ЯБЛУНІ

БОРОШНИСТА РОСА

МОНІЛІОЗ

АЛЬТЕРНАРІОЗ

Культура	Норма витрати препарату	Норма витрати робочої рідини	Шкідливі об'єкти	Кратність обробок / Термін очікування
<i>Дозволено для застосування в промисловому секторі</i>				
ЧЕРЕШНЯ	4–5 мл на 8–10 л води	1,5–4 л розчину на дерево залежно від розміру крони	Кокомікоз, моніліальний опік, борошниста роса	2/40
ПЕРСИК	5 мл на 8–10 л води	1,5–4 л розчину на дерево залежно від розміру крони	Клястероспоріоз, моніліальний опік, борошниста роса	2/40
ПЕРСИК	7,5 мл на 8–10 л води	1,5–4 л розчину на дерево залежно від розміру крони	Кучерявість листя	2/40
КАРТОПЛЯ	2,5 мл на 5 л води	5 л розчину на сотку	Альтернатіоз	2/7
ТОМАТИ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ	4 мл на 5 л води	5 л розчину на сотку	Борошниста роса, альтернатіоз	2/3–7
ТОМАТИ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ	3 мл на 5 л води	8 л розчину на сотку	Альтернатіоз	2/14
ОГІРКИ	3 мл на 5 л води	5 л розчину на сотку	Борошниста роса	2/14
КАПУСТА	3 мл на 5 л води	5 л розчину на сотку	Альтернатіоз	2/20
ЦИБУЛЯ	4–5 мл на 5 л води	5 л розчину на сотку	Альтернатіоз, стеффіліоз, борошниста роса	2/20
МОРКВА	3 мл на 5 л води	5 л розчину на сотку	Борошниста роса, альтернатіоз	2/20
КАВУН	3 мл на 5 л води	5 л розчину на сотку	Борошниста роса	2/20
<i>Виявлено високу ефективність препарату</i>				
ТРОЯНДИ	3 мл на 8–10 л води	0,5–1,5 л розчину на куц	Борошниста роса	2/–