



НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ
У БОРОТБІ ІЗ СІРОЮ ГНИЛЛЮ



Світч® 62,5 WG, в. г.

ЗАХИЩАТИ РОСЛИНИ СТАЄ ПРОСТІШЕ

ЦІЛЬОВИЙ ОБ'ЄКТ

Томати, огірки, суниця, троянди

375 г/кг ципродинілу,
250 г/кг флудиоксонілу

Анілінопіримідини,
фенілпіроли

Готовий
до використання
спрей



II



1 л



4 роки



ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ СПРЕЮ:

- Короткий шлях від проблеми до рішення
- Простий і зручний у використанні
- Економія часу й зусиль
- Не потребує спеціальних знань та обладнання
- Унеможливорює помилку при приготуванні робочого розчину
- Мінімум контакту з препаратом

Культура*	Норма витрати	Шкідливі об'єкти	Кратність обробок / Термін очікування, дні
ТОМАТИ	1 л готового препарату на 20 м ²	Хвороби при зберіганні (альтернаріоз, антракноз, фузаріоз, мокра й сіра гнилі)	2/10
ОГІРКИ		Хвороби при зберіганні (альтернаріоз, антракноз, фузаріоз, мокра й сіра гнилі)	2/10
СУНИЦЯ		Сіра гниль ягід, бура і біла плямистості листя, борошниста роса	2/7
ТРОЯНДИ		Фузаріозна, альтернаріозна та сіра гнилі	2/15

* Дозволений до використання на всіх культурах згідно з реєстрацією фунгіциду Світч®.