


ОСНОВНІ ХВОРОБИ ТОМАТІВ ТА КАРТОПЛІ

ФІТОФТОРОЗ

Уражує листя, стебла, плоди, бульби. Без належного захисту та за сприятливих погодних умов хвороба може за декілька днів уражити до 90 % посадок картоплі та томатів. Зазвичай фітофтороз на томатах проявляється на 7–10 днів пізніше, ніж на картоплі. Уражені бульби при зберіганні загнивають, додатково на них розвиваються сухі та мокрі гнілі (фузаріоз, фомоз та інші).



АЛЬТЕРНАРІОЗ

Уражує листя, стебла, плоди й іноді бульби. Зазвичай перші ознаки пошкодження з'являються у кінці цвітіння. Може уражатися розсада. Пошкоджені плоди непридатні для вживання та переробки. На бульбах проявляється через 2–3 тижні після збирання.



ПОБІЧНА ДІЯ:

Ризиктоніоз, септоріоз та деякі інші хвороби.

ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ЗАХИСТ ТОМАТІВ ТА КАРТОПЛІ

syngenta

03022, м. Київ,
вул. Козацька, 120/4, 3-й поверх

тел.: +380 (44) 494 17 71
факс: +380 (44) 494 17 70

Консультаційний центр
тел.: 0 800 50 04 49
Безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні

www.syngenta.ua



Ревус®Топ

syngenta

Розкриймо потенціал рослинки разом

Ревус®Топ

syngenta

РЕВУС ТОП

Новий системно-трансламінарний фунгіцид широкого спектра дії. Має профілактичну і лікувальну дії, забезпечує надійний захист від фітофторозу та альтернаріозу. Справляє побічну дію на антракноз, септоріоз, кладоспоріоз, ризиктоніоз.

Склад препарату: мандіпропамід — 250 г/л;
дифеноконазол — 250 г/л.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- поєднання двох діючих речовин забезпечує високу ефективність проти фітофторозу та альтернаріозу;
- відмінні профілактична та лікувальна дії;
- стабільна ефективність за будь-яких погодних умов, стійкий до змивання опадами;
- значно підвищує якість зберігання продукції.




ЗАСТОСУВАННЯ

Ревус Топ необхідно використовувати при загрозі появи альтернаріозу та фітофторозу в період завершення цвітіння і на початку бульбоутворення картоплі та зав'язування плодів у томатів, коли ріст рослин уповільнюється і триває постійне оновлення листкового апарату. Найкращу ефективність препарат демонструє при профілактичному застосуванні. Оптимальна температура внесення — +15–25 °С.

Культура	Спектр дії	Норма витрати, мл/сотка	Кратність обробок / Термін очікування
ТОМАТИ КАРТОПЛЯ	Альтернаріоз, фітофтороз	6	3/14

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ТОМАТІВ

При обприскуванні використовувати 3–5 л робочого розчину на 1 сотку (залежно від типу обприскувача). Не допускати стикання робочого розчину з оброблюваних рослин.



* Зареєстровано в промисловому секторі.
** Обробка ґрунту до висадки розсади.