

БЕЗПЕЧНИЙ СТАРТ ДЛЯ СОЇ



 **Баундарі[®]**

syngenta[®]

Баундарі® — це селективний, ґрунтовий гербіцид, що дозволяє знищити однорічні злакові та дводольні бур'яни одночасно без фітотоксичності на сою, навіть за надмірного зволоження.



ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

Склад	S-метолахлор 628,13 г/л + метрибузин 149,36 г/л
Механізм дії	Ґрунтовий, селективний гербіцид
Культури	Соя
Норма внесення	2,2–2,5 л/га
Преп. форма	Концентрат суспензії
Упаковка	5 л

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Комплексний препарат, що дозволяє знищити однорічні злакові та дводольні бур'яни одночасно
- Відсутня фітотоксичність (промивання) на сою, навіть за надмірного зволоження
- Покращена ефективність проти амброзії полинолистої, канатника Теофраста й однорічних злаків у порівнянні з іншими конкурентними гербіцидами
- Дозволяє сої стартувати без бур'янів та повністю розкрити генетичний потенціал рослини
- Має розтягнутий період захисної дії посівів сої — до 1,5 місяця

ВЗАЄМОДОПОВНЕННЯ ДВОХ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН ЗБІЛЬШУЄ СПЕКТР БУР'ЯНІВ, ЩО ЗНИЩУЮТЬСЯ

Дводольні бур'яни (> 90 %)	Злакові бур'яни (> 90 %)
Канатник Теофраста, амброзія полинолиста, щириця (види), лобода біла, лобода гібридна, дурман звичайний, грицики звичайні, галінсога (види), гірчак (види), гібіскус трійчастий, гірчиця польова, паслін чорний, талабан польовий, портулак городній	Куряче просо (плоскуха звичайна), тонконіг однорічний, мишій (види), елевзина індійська, просо волосоподібне, просо напівквітуче

ПОРІВНЯННЯ РОБОТИ ГЕРБІЦИДУ БАУНДАРІ® З КОНКУРУЮЧИМИ ПРОДУКТАМИ



Баундарі® 2,5 л/га



Пропізахлор 1,5 л/га +
флуміоксазин 80 г/га —
затримка культури в рості




Диметанамід 1,2 л/га +
пендиметалін 3,0 л/га —
пошкодження листя культури


БАУНДАРІ® — ВІДМІННИЙ КОНТРОЛЬ БУР'ЯНІВ ЗА РІЗНИХ НОРМ ЗАСТОСУВАННЯ



Контроль



Баундарі® 2,2 л/га



Баундарі® 2,5 л/га

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Фаза розвитку культури	Внесення тільки до сходів культури (соєа)
Норма внесення	На піщаних (легких) ґрунтах можна знижувати норму внесення до 1,8–2,0 л/га з подальшим послідовним внесенням післясходових гербіцидів. На всіх інших типах ґрунтів — норма 2,2–2,5 л/га (більша норма застосовується за вищого рівня гумусу — $\geq 3\%$).
Фітотоксичність	Відсутня, навіть за надмірного зволоження. При рН ґрунту більше ніж 7 рекомендовано знижувати норму внесення препарату до 1,8–2,0 л/га з подальшим послідовним застосуванням відповідних післясходових гербіцидів.
Ротація культур у сівозміні	У разі пересіву — соєа. Через 4 місяці — кукурудза, озима пшениця, озимий ячмінь, люцерна. Через 8 місяців — горох, яра пшениця, ярий ячмінь. Через 12 місяців — спаржа, томати, кормові трави, сочевиця. Через 18 місяців — цукрові буряки, цибуля та інші коренеплоди.



Розкриймо потенціал рослини разом.

syngenta

03022, м. Київ,
вул. Козацька, 120/4, 3-й поверх

тел.: +380 (44) 494 17 71
факс: +380 (44) 494 17 70

Консультаційний центр

☎ 0 800 50 04 49

Безкоштовно зі стаціонарних
телефонів в Україні

www.syngenta.ua

ОФІЦІЙНИЙ ДОДАТОК
«СИНГЕНТА»



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play