

НАЙБЕЗПЕЧНІШИЙ ГРАМІНІЦИД ДЛЯ КУКУРУДЗИ



 **Minagro®**

syngenta®

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

 ПОВНА НАЗВА	МІЛАГРО 040 SC к.с.
 КУЛЬТУРА	Кукурудза
 ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	40 г/л нікосульфурону
 ХІМІЧНА ГРУПА	Сульфонілсечовини
 ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат суспензії
 КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
 УПАКОВКА	5 л

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ



Висока селективність
для кукурудзи

Повна безпека
для культури

Не має післядії у сівозміні



Знищує всі злакові бур'яни разом
із кореневою системою, серед них
і багаторічні, як-от пирій повзучий
і гумаї

Швидко зупиняє ріст бур'янів
і їх конкуренцію з культурою



Ідеальний партнер
для гербіцидів проти
дводольних бур'янів

Можна застосовувати
на ділянках гібридизації
кукурудзи

ПРИНЦИП ДІЇ ПРЕПАРАТУ

Мілагро® інгібує поділ клітин шляхом блокування синтезу основних амінокислот

Бур'яни швидко припиняють ріст і конкуренцію з культурою, набирають червоного відтінку і поступово повністю гинуть (приблизно через 3 тижні)

Мілагро® поглинають листки і стебла бур'янів, і він швидко переміщується до кореневої системи рослин

Мілагро® не має активності в ґрунті і не має післядії

ВІКНО ЗАСТОСУВАННЯ НА КУЛЬТУРИ

Бур'яни	Фаза росту	Норма, л/га
Багаторічні злакові	15–25 см 4–5 листків	1,25
Однорічні злакові	3–4 листки	1,0
Однорічні дводольні	2–4 листки	1,0

РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ



БАКОВІ СУМІШІ

Бур'яни	Норма, л/га
Злакові та дводольні бур'яни, в т. ч. падалиця соняшнику (звичайна)	Мілагро® (1,0–1,25 л/га) + Пік® (5–7 г/га)
Злакові та дводольні бур'яни, в т. ч. осоти (жовтий і рожевий), падалиця соняшнику (ІМІ й сульфостійка), лобода, хвощ	Мілагро® (1,0–1,25 л/га) + Пріма™ Форте (0,5 л/га) або (0,7 л/га) (хвощ, осоти)
Злакові та дводольні бур'яни, в т. ч. березка польова	Мілагро® (1,0–1,25 л/га) + Діален Супер® (0,6–0,8 л/га)
Злакові та дводольні бур'яни, в т. ч. перерослі, після 8-го листка культури	Мілагро® (1,0–1,25 л/га) + Каллісто® (0,2 л/га) + ПАР (Сайд-Кік 0,2 л/га)



ЗАСТОСУВАННЯ СУМІШІ



Знищення падалиці соняшнику (як пророслої, так і тієї, що проростає за рахунок ґрунтової дії препарату)

Підсилення дії проти дводольних бур'янів (однорічних і багаторічних)

Безпечно для культури

Поєднання ефективності й економічності



На полях із невизначеним спектром бур'янів, де є березка польова, осоти (програма очищення від багаторічних дводольних)

Жодного ризику післядії після використання такої суміші на наступні культури у сівозміні

Швидкий результат проти всього спектра бур'янів



На полях з осотами та хвощем (програма очищення від багаторічних дводольних)

На полях із падалицею соняшнику, стійкою до імідазолінонів та сульфонілсечовин

Перерослі бур'яни (якщо більше 4 листків у дводольних). Інші важковикорінювані бур'яни

Ґрунтова дія проти наступних хвиль дводольних бур'янів



Для обробки проти багаторічних бур'янів та падалиці соняшнику після 6-го листка кукурудзи

Якщо потрібно знищити паслін чорний

При загрозі появи наступних хвиль бур'янів (наприклад, при дощах)

Бур'яни, стійкі до сульфонілсечовин та імідазолінонів (наприклад, падалиця гібридів соняшнику, стійких до цих гербіцидів)

Можна використовувати на ділянках гібридизації



Розкриймо потенціал рослини разом

Розкриймо потенціал рослини разом

syngenta®

03022, м. Київ,
вул. Козацька, 120/4, 3-й поверх

тел.: +380 (44) 494 17 71
факс: +380 (44) 494 17 70

Консультаційний центр

☎ 0 800 50 04 49

Безкоштовно зі стаціонарних
телефонів в Україні

www.syngenta.ua

ОФІЦІЙНИЙ ДОДАТОК
«СИНГЕНТА»



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play